

## INSTRUCTIVO DE USO

# Eyestil® LIPID

Lubricante ocular

**ESTÉRIL** / Libre de conservadores

Fórmula:

Cada mL contiene:

Lípidos.....100 mg

Vehículo cbp.....1 mL

**Eyestil® LIPID** lubricante ocular en alteraciones de la película lagrimal por deficiencia del componente lipídico, aliviando los síntomas del ojo seco.

### **Características y mecanismo de acción:**

**Eyestil® LIPID** es una emulsión de aspecto lechoso constituida de un componente acuoso y una mezcla de lípidos naturales con una acción lubricante e hidratante para la superficie del ojo. Después de la aplicación de **Eyestil® LIPID** en el saco conjuntival, ambos componentes, el acuoso y el lipídico se integran con la lágrima formando una barrera protectora que reduce la evaporación.

### **Indicaciones y forma de administración:**

Producto higiénico, lubricante para sequedad ocular.

Vía de administración: Oftálmica

Dosis: Aplicar 1 o 2 gotas en cada ojo cuatro veces por día, o de acuerdo a la prescripción médica.

### **Precauciones y advertencias de uso:**

No ingerible. Antes de su uso, asegúrese que el envase monodosis esté intacto.

No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

**Eyestil® LIPID** no debe administrarse con el uso de lentes de contacto, mismos que podrán colocarse 30 minutos después.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25° C.

No se deje al alcance de los niños.

Una vez abierto el sobre que contiene las 5 unidades monodosis, éstas deberán ser conservadas dentro del mismo sobre y utilizadas dentro de los 20 días siguientes.

Deséchese el sobrante después de su uso.

Estudios de compatibilidad han demostrado que el producto no altera las características físicas, inclusive la transparencia, de los lentes de contacto.

### **Efectos secundarios:**

Después de la administración de **Eyestil® LIPID** puede dar una sensación momentánea de visión borrosa que desaparece rápidamente al parpadeo.

Ocasionalmente se puede manifestar una sensación de ardor leve y transitorio.

Si persisten las molestias consulte al especialista oftalmólogo.

**Interacciones con medicamentos:**

Administrar **Eyestil® LIPID** solo después de 20 minutos de la aplicación de medicamentos oftálmicos.

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

**Instrucciones de apertura del envase:**

1. Abrir el sobre sin romperlo en su totalidad y sacar la tarjeta de 5 unidades
2. Tomar la tarjeta y cortar una unidad girando y jalando por la parte central
3. Abrir por la punta girando la tapa de la ampolla.
4. Invertir la posición del envase y aplicar la dosis indicada en cada ojo, apretando ligeramente la ampolla.
5. Desechar el sobrante de la unidad utilizada y guardar las unidades restantes dentro del sobre.

**Presentaciones:**

Caja con 4 sobres con 5 unidades monodosis de 0.3 mL cada una.

Caja con 6 sobres con 5 unidades monodosis de 0.3 mL cada una.

Registro Sanitario 0544C2016 SSA

Hecho en Italia por:

SIFI S.p.A.

Vía E. Patti 36

95025 Lavinaio - Aci S. Antonio (CT)

Italia

Importado y distribuido por:

Laboratorios SIFI de México, S.A. de C.V.

Parque Empresarial Nor T Nave 5°C interior 3C

Colonia Recursos hidráulicos C.P. 54913

Tultitlan, Estado de México, México

Producto Italiano

®Marca Registrada



*Conserva el medio ambiente, deposita el envase vacío en la basura.*

No incluido impreso en el producto, disponible en versión audible o de lectura (PDF), escaneando el código QR impreso en la caja.

Sitio de internet ligado al Código QR: <http://qr.sifigroup.com/1g305650/>

Scan:

